

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

DLP 21-8-74 076113

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION "CENTRE" (Tél. 86-36-24)

(CHER, INDRE, LOIRET, LOIR-ET-CHER, INDRE-ET-LOIRE, EURE-ET-LOIR)

Sous-Régie de la Protection des Végétaux, 93, rue de Curambourg - 45400 FLEURY-LES-AUBRAIS

C.C.P. : La Source 4.604-25

ABONNEMENT ANNUEL

30 Francs

BULLETIN TECHNIQUE N° 32

20 AOÛT 1974

CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES

ARBRES FRUITIERS

Le deuxième vol se poursuit et des captures sont toujours observées dans les pièges sexuels. Jusqu'à ces derniers jours, les conditions climatiques sont restées favorables à l'activité sexuelle et aux pontes.

Les indications données dans notre bulletin du 5 Août restent toujours valables. Dans les vergers où aucune attaque n'a été observée jusqu'au 20 Juillet et où les risques de voisinage sont nuls, aucune intervention n'est nécessaire maintenant contre ce ravageur. Dans les autres vergers, un nouveau traitement est nécessaire dans les prochains jours car le traitement conseillé dans notre bulletin technique du 5 Août arrive en fin d'efficacité.

Il y a lieu de respecter scrupuleusement les délais d'emploi des pesticides tels qu'ils ont été précisés dans le bulletin technique n° 11.

TAVELURES - ACARIENS - PSYLLES

Les indications données dans notre bulletin du 5 Août restent toujours valables. Il est notamment recommandé de surveiller les poiriers afin d'éviter des infestations tardives de psylles toujours très dangereuses.

DESINFECTION DES SEMENCES DE COLZA

CULTURES OLEAGINEUSES

Le but de la désinfection des semences est de protéger les jeunes plantes contre les fontes de semis et les altises.

Les fongicides qui peuvent être utilisés sont : le Silicate de Méthoxyethylmercure, le Thirame, l'Oxyquinoléate de Cuivre, le Dichlone et le Captafol.

Contre les altises, on peut employer un produit à base de Lindane à forte concentration (75 à 90 % de matière active) à la dose de 45 g de matière active par kilogramme de semences. Différents procédés permettent une meilleure adhésivité, notamment l'adjonction d'une cuillère à café d'huile végétale par kilogramme de semences.

MILDIOU DU TABAC

TABAC

Depuis notre bulletin du 14 Août, trois nouveaux foyers ont été décelés sur les communes de Sambin (41), Barrou (37) et Charnizay (37).

Il est conseillé de suivre les indications données dans notre bulletin du 1er Août.

Les Ingénieurs chargés des
Avertissements Agricoles

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie
Chef de la Circonscription phytosanitaire " CENTRE "

G. RIBAUT
B. LELIEVRE

G. BENAS